



# Undersøgelse af blødning tidligt i graviditeten

Mange gravide oplever en blødning fra underlivet i løbet af de første uger af graviditeten. Det giver naturligvis anledning til bekymring, men oftest er en mindre blødning ganske harmløs.

20-30 % af de gravide, som føder til terminen, har haft blødning tidligt i graviditeten.

Ved blødninger til og med graviditetsuge 12 er prognosen god. Mindre end 20 % af tilfældene ender med abort. Viser en ultralydsskanning et levende foster, er prognosen for at gennemføre graviditeten 90 %.

## Årsager til blødning

Mange gravide spekulerer på, om de har gjort noget forkert, hvis de oplever blødning i graviditeten, men det kan man stort set altid afvise. En normal graviditet kan holde til et normalt liv.

Blødningen kan skyldes, at:

- man bløder fra livmoderhalsen
- en ufrivillig abort er på vej
- man er i gang med at abortere
- graviditeten sidder uden for livmoderen.

## SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Du skal have lavet en gynækologisk undersøgelse, hvor vi eventuelt tager en podning for bakterier. Du skal også ultralydsskannes.

Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt fosteret udvikler sig normalt, vil vi løbende kontrollere dit blod for graviditetshormonet hCG.

## Blodprøver til kontrol af hCG

Målingen af hCG viser, hvor meget graviditetshormon der er i blodet. Ved en normal graviditet fordobles mængden af hCG hver anden dag i de første uger af graviditeten.

Du kan få taget blodprøver på Klinisk Biokemisk Afsnit i Hjørring og Frederikshavn. Hvis du får taget

blodprøve om morgenen, har vi allerede svaret om eftermiddagen.

Du kan også få taget blodprøver hos din egen læge. Det skal du selv bestille tid til, og vi får svaret næste dag.

Vores læge ser på resultatet af dine blodprøver og følger udviklingen i indholdet af hCG. Som regel aftaler vi, at lægen ringer til dig med svaret på prøverne, og vi aftaler, hvad der skal ske fremover.

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Søg læge, hvis du oplever komplikationer

Kontakt din egen læge eller Lægevagten, hvis du:

- får meget kraftig blødning
- får stærke smerter
- får feber
- får ildelugtende blødning eller udflåd
- bliver utilpas, svimmel eller besvimer.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Gynækologisk Ambulatorium

Tlf. 97 64 07 41

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 8.30 – 15.00