



Behandling med Botox® i blæren

Du har i samråd med en urolog valgt at blive behandlet med indsprøjtninger med Botox® i blæren. Når Botox® bliver indsprøjtet i blærens slimhinde, vil blærens muskler bedre kunne slappe af.

Årsagerne til behandlinger med Botox® kan være:

- overaktiv blære
- nerveskade i rygmarven (sklerose eller ulykkestilfælde).

Botox® vil virke ved at:

- reducere blærens sammentrækninger
- øge den mængde urin, som blæren kan rumme
- reducere omfanget af urinlækage
- reducere fornemmelsen af pludselig vandladningstrang
- reducere, hvor ofte du føler trang til at lade vandet
- give dig bedre kontrol over din vandladning.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

Idet Botox® afslapper blæren i mere eller mindre grad, er det ikke sikkert, at du vil være i stand til at tømme blæren efter behandlingen. Det kan derfor blive nødvendigt for dig at anvende et engangskateter. Du vil blive oplært i at anvende et engangskateter inden behandlingen. Hvis du skal anvende et engangskateter, behøver du kun at tømme blæren hver 3.- 4. time på et tidspunkt, der passer dig.

Selve behandlingen

Du får lagt en lokalbedøvende gel op i dit urinrør. Når bedøvelsen virker, fører lægen et tyndt kikkertrør op i blæren, hvorefter blæren bliver fyldt med lunkent sterilt saltvand. Det gør, at vi bedre kan se den indvendige side af blæren.

Behandlingen varer 30-60 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Lav en urinprøve

Vi skal være sikre på, at du ikke har en urinvejsinfektion inden behandlingen. Du skal derfor gå til din egen læge med en urinprøve 1 uge inden behandlingen.

Vask dig grundigt

Vask dig grundigt i skridtet, inden du kommer til behandlingen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Forvent at have gener ved vandladning

Det er normalt at have svie ved vandladning de første dage, ligesom det er normalt at have lidt blod i urinen i nogle dage. Du kan lindre eventuelle smerter med smertestillende medicin fra håndkøb.

Forebyg blærebetændelse

Der er altid en risiko for, at du kan få blærebetændelse. Det skyldes, at de instrumenter, vi bruger under behandlingen, kan lave små rifter, som der kan gå betændelse i. Du kan forebygge dette ved at drikke rigeligt med vand, så urinvejene bliver skyllet godt igennem. Ligeledes er det vigtigt, at du er omhyggelig med at tømme din blære regelmæssigt, enten ved naturlig vandladning eller ved brug af kateter. Mangelfuld eller sjælden blæretømning giver større infektionsrisiko.

Afvent behandlingens resultat

Du kan først vurdere det endelige resultat af behandlingen efter 7-14 dage.

Forny eventuelt behandlingen

Virkingen af behandlingen aftager gradvist, og efter cirka 6-8 måneder vil den blæreafslappende virkning være ophørt. Er du interesseret i en ny behandling, skal du kontakte os for en ny samtale.



KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00