



# Blæreskylning med Calmette-vaccine

Du skal i behandling med Calmette-vaccine på grund af forandringer eller svulster i slimhinden i din blære. Behandlingen med Calmette foregår som blæreskylninger.

## SÅDAN VIRKER VACCINEN

Calmette er en bacille, som er med til at forhindre, at der gendannes slimhindeforandringer i blæren. Behandlingen virker ved at stimulere kroppens eget celforsvar i blærevæggen. På den måde hjælper blæreskylningen med til at mindske og forebygge eventuelle nye svulster i blæren.

## SÅDAN FOREGÅR BLÆRESKYLNINGEN

Calmette er et pulver, som opløses i 50 ml saltvand. Vi lægger opløsningen op i din blære ved hjælp af et kateter.

Væsken skal blive i blæren i 2 timer for at have bedst mulig effekt. Du skal helst være i aktivitet imens, så væsken bevæger sig rundt i blæren og behandler hele blærevæggen. Når de 2 timer er gået, lader du vandet og tømmer på den måde blæren for Calmette-væsken.

Ved den første behandling skal du blive i ambulatoriet, indtil du har ladt vandet, så vi sikrer os, at du kan tåle behandlingen. Ved de efterfølgende behandlinger må du tage hjem umiddelbart efter, at du har fået væsken lagt op i blæren.

### Undgå at drikke før og under behandlingen

Vi anbefaler, at du ikke drikker noget 2 timer før behandlingen og i de 2 timer, behandlingen varer. Så undgår du at skulle lade vandet, imens behandlingen foregår.

### Undersøgelse for blærebetændelse

Lige inden hver behandling beder vi dig om at lade vandet. Det skyldes dels, at din blære skal være helt tømt, før vi lægger Calmette-væsken op, og dels at vi

har brug for en urinprøve, som vi undersøger for blærebetændelse.

Hvis du har blærebetændelse, er vi nødt til at udsætte din behandling.

### Du skal have 6 behandlinger

Du skal have skyllet blæren 1 gang om ugen i 6 uger. Den første behandling får du cirka 6 uger efter, at du har fået lavet en kikkertundersøgelse af blæren eller fået fjernet en svulst fra blæren.

### Resultatet af behandlingen

Cirka 2 måneder efter din sidste blæreskylning skal du have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren, også kaldet en cystoskopi, som viser, hvordan behandlingen med Calmette har virket.

Du får tid til undersøgelsen og mere information om, hvordan den foregår, når du får din sidste blæreskylning.

## BIVIRKNINGER

I de første døgn efter blæreskylningen kan du opleve følgende gener:

- Kvalme
- Blærebetændelse
- Hyppig vandladningstrang
- Smerter ved vandladning
- Feber op til 38,5 grader
- Influenzalignende symptomer
- Almindelig utilpashed.

Får du sværere gener og i længere tid, fx feber over 38,5 grader, ledsmerter, opkastning eller tegn på allergiske reaktioner, skal du kontakte os. Uden for vores åbningstid skal du kontakte Lægevagten.



## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

### Brug prævention

Så længe du er i behandling og får blæreskylnin-  
gerne, skal I bruge kondom under samleje. Kvinder i  
den fødedygtige alder bør også bruge anden form for  
prævention.

### Sid ned på toilettet

Du bør sidde ned og lade vandet for at hindre sprøjt  
uden for toilettet.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte  
os.



### Kontakt

#### Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00