



# Blæreskylning med Mitomycin efter fjernelse af polyp i urinblæren

Du skal have fjernet en polyp fra urinblæren ved en kikkertoperation. Efter operationen skal du have skyllet blæren med Mitomycin for at forbygge dannelsen af nye polypper.

Hvis det lykkes at fjerne polyppen fuldstændigt ved operationen, reduceres risikoen for, at du får en ny polyp. Hvis du får skyllet din blære med Mitomycin inden for 24 timer efter operationen, reduceres risikoen for ny polypdannelse yderligere.

## SÅDAN VIRKER MEDICINEN

Mitomycin er en cellegift, som hæmmer celledeling. Den har til formål at hindre dannelsen af polypper i blæren.

## SÅDAN FOREGÅR BLÆRESKYLNINGEN

Ved afslutningen af kikkertoperationen får du lagt et kateter i din blære. Når du er tilbage på sengeafsnittet efter operationen, får du sprøjtet Mitomycin ind i blæren via kateteret. Mitomycinen skal ligge i blæren i 2 timer. Efter de 2 timer tømmer vi Mitomycinen ud af blæren gennem kateteret og fjerner kateteret.

Du bliver udskrevet, når du kan lade vandet normalt.

## BIVIRKNINGER

De hyppigste bivirkninger af blæreskylningerne er udslet i håndfladerne og symptomer på blærebetændelse som svie ved vandladning og hyppige vandladninger. Hvis symptomerne på blærebetændelse fortsætter i flere dage, skal du kontakte din læge og få undersøgt din urin for bakterier.

Din urin er blålig det første døgn efter blæreskylningen. Det er helt normalt og ganske ufarligt.

Det første døgn efter hver blæreskylning kan du have blod i urinen. Det er helt normalt, men fortsætter det i flere dage, skal du kontakte din læge.

## KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



### Kontakt

#### Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00