



Funktionsundersøgelse af blæren

Du skal have lavet en funktionsundersøgelse af din blære for at finde årsagen til dine vandladningsgener.

Undersøgelsen viser blandt andet, hvor meget din blære kan rumme, hvornår vandladningstrangen opstår, hvordan blæren trækker sig sammen under vandladningen, og hvor meget bugmusklerne påvirker vandladningen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen starter med, at du lader vandet på almindelig vis.

Herefter får du lagt 2 katetre. Det ene lægger vi op i din blære, og det andet lægger vi op i din endetarm. Kateteret i blæren registrerer trykket i blæren, og kateteret i endetarmen registrerer trykket i bughulen. Vi bruger en lokalbedøvende gel, når vi lægger katetere.

Efter vi har lagt katetrene, bliver blæren langsomt fyldt med lunkent saltvand. Når du føler vandladningstrang, skal du forsøge at lade vandet med kateteret i blæren. Imens måler vi trykket i og uden for blæren. Herefter fjerner vi begge katetre, og undersøgelsen er slut.

Du får svar samme dag

Efter undersøgelsen, som bliver foretaget af en sygeplejerske, kommer du til at tale med en læge. I drøfter resultatet af undersøgelsen og dine behandlingsmuligheder.

Du skal forvente, at der kan være ventetid mellem undersøgelsen og samtalen med lægen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vær opmærksom på blærebetændelse

Har du i ugen op til undersøgelsen mistanke om, at du har blærebetændelse, skal du få din urin undersøgt hos din egen læge.

Har du blærebetændelse, skal du i behandling med antibiotika, ellers kan vi ikke lave undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM

Det første døgn efter undersøgelsen kan du have let svie ved vandladning og eventuelt lidt blod i urinen. Det er vigtigt, at du drikker cirka 2 liter væske i løbet af resten af døgnet for at forebygge blærebetændelse.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.



Kontakt

Urologisk Afsnit

Tlf. 97 64 18 57

Vi træffes bedst:

Mandag – fredag 7.30 – 15.00